

## Flora of Karuizawa (VIII)

By

Hiroshi HARA

原 寛: 軽井澤ノ「フローラ」(其八)

70) *Stachyuraceae*.

- 404) **Stachyurus praecox** SIEBOLD et ZUCCARINI, Fl. Jap. I, p. 43 (1835)  
きぶし.  
Hab. Usui pass, New Usui pass.

71) *Elaeagnaceae*.

- 405) **Elaeagnus crispa** THUNBERG ex MURRAY Syst. Veg. p. 163 (1784).  
**var. typica** NAKAI, Fl. Sylv. Korea XVII, p. 10 (1928). あきぐみ.  
Hab. Karuizawa plain, Mt. Yagasaki.
- 406) \***Elaeagnus nikoensis** NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLIV, p. (57) (1930),  
nom. seminud. につくわうなつぐみ. (cf. next page).  
Hab. Mt. Kose, Mt. Atago. New Usui pass, etc.

72) *Lythraceae*.

- 407) **Lythrum Salicaria** LINNAEUS, Sp. Pl. ed. 1, p. 446 (1753).  
えぞみそはぎ.  
Hab. Karuizawa plain.
- 408) **Rotala indica** KOEHNE in Engl. Bot. Jahrb. I, p. 172 (1881).  
**var. uliginosa** KOEHNE, l. c. p. 173. きかしぐさ.  
Hab. Karuizawa plain.

73) *Alangiaceae*.

- 409) **Marlea macrophylla** SIEBOLD et ZUCCARINI in Abh. Akad. Wiss.  
Muench. IV.-2, p. 135 (1845).  
**var. trilobata** NAKAI, Fl. Sylv. Korea. XVII, p. 26 (1928). うりのき.  
Hab. Mt. Yagasaki.

74) *Oenotheraceae*.

- 410) **Circaea erubescens** FRANCHET et SAVATIER, Enum, Pl. Jap. II, 370  
(1876). たにたで.

Hab. Mt. Atago, Mt. Yagasaki, Mt. Hanare, etc.

- 411) **Circaea quardrisulcata** FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap. I, p. 169 (1875). みづたまさう.

Hab. Karuizawa plain.

- 412) **Epilobium angustifolium** LINNAEUS, Sp. Pl. ed. I, p. 347 (1753).

やなぎらん.

Hab. Mt. Kose.

\* **Elaeagnus nikoensis** NAKAI.

Frutex. Rami vetusti fusi, hornotini cupreo-lepidoti. Folia annua. Laminae foliorum ellipticae vel oblongae vel ovatae, vulgo 7-9cm. longae 3-5cm. latae, apice attenuato-obtusae vel obtusae, basi obtusae vel cuneatae supra primo dense cuprescenti-stellato-pilosae haud lepidotae demum glabrae virides, subtus dense argenteo-lepidotae etl epilibus cupreis punctulatae, margine leviter minute crispae. Petioli 5-10cm. longi. Flores in mense Junio patentes, axillares, 1-3 fasciculares, penduli, pedicellis 8-15mm. longis. Ovarium oblongum ca. 3mm. longum, cupreo-lepidotum. Tubus calycis 6-7mm. longus 3mm. latus, extus cuprescenti-lepidotus, intus vulgo stellato-pilosus. Lobi calycis 4, late ovati 4mm. longi, extus cuprescenti-lepidoti, intus ochroleuca praeter marginem stellato-pilosi. Antherae 1.5mm. longae. Stylus basi parce stellato-pilosus, stigmatate curvato. Fructi in mense Augusto maturantes, ellipsoidei 10mm. longi 6mm. lati, colore "Nopal red," rubescenti-lepidoti, pedicellis 2-3cm. longis.

Nom. Jap. *Nikko-natsu-gumi*.

Hab. Honshu: prov. Shimotsuke: Nikkō (T. NAKAI-Jun. 1922-fl. typus).—ibid. (M. HONDA; H. Ito)

prov. Kōdzuke: Usui-tōge (H. HARA-Jul. 30, 1932-fr.)




Fig. 5. *Elaeagnus nikoensis* NAKAI.

にっくわなつぐみ

prov. Shinano : in monte Kose (H. HARA-Jun. 21, 1931).

- 413) **Epilobium cephalostigma** HAUSSKNECHT, Monog. Epilob. p. 195 (1884)

いはあかばな.

Hab. Usui pass, Mt. Ichinoji, etc.

- 414) **Epilobium palustre** LINNAEUS, Sp. Pl. ed. I, p. 348 (1753).

やなぎあかばな.

Hab. Karuizawa plain.

- 415) **Epilobium pyrricholophum** FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap.

II, p. 370 (1876). あかばな.

Hab. Mt. Kiritsumi, Kawagoeishi valley.

- 416) **Oenothera Lamarkiana** SERINGE in DC, Prodr. III, p. 47 (1828).

おほまつよひぐさ.

Hab. Karuizawa (naturalized).

- 417) **Oenothera** sp.

This plant is naturalized in Karuizawa plain. The flowers are very small and the petals are only 1cm. long.

#### 75) Haloragaceae.

- 418) **Halorrhagis micrantha** R. BROWN apud SIEBOLD et ZUCCARIN in Abh.

Akad. Wiss. Muenchen IV-II, p. 133 (1845). ありのたふぐさ.

Hab. Karuizawa plain.

- 419) **Myriophyllum verticillatum** LINNAEUS, Sp. Pl. ed. I, p. 992 (1753).

ふさも.

Hab. Karuizawa plain.

#### 76) Araliaceae.

- 420) **Acanthopanax spinosum** MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. I, p.

10 (1863). うこぎ.

Hab. Karuizawa plain, Mt. Atago, etc.

- 421) **Aralia cordata** THUNBERG, Fl. Jap. p. 127 (1784). うど.

Hab. Mt. Atago, New Usui pass, etc.

- 422) **Aralia elata** SEEMANN in Journ. Bot. VI, p. 134 (1868). たらのき.

Hab. Mt. Atago, Mt. Kose, etc.

- 423) **Kalopanax pictum** NAKAI, Fl. Sylv. Korea. XVI, p. 34 (1927).

**var. magnificum** NAKAI, l. c. p. 36. けはりぎり.

Hab. Mt. Kose, Mt. Atago, Usui pass, etc.

- 424) **Panax japonicum** C. A. MEYER in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. I,

p. 340 (1843).

**f. typica** NAKAI in Jour. Arn. Arb. V, p. 33 (1924). とちばにんじん.

Hab. Mt. Kiritsumi.

77) *Umbelliferae*.

- 425) **Angelica Matsumurae** YABE, Rev. Umbell. Jap. p. 85 (1902)  
**var. glabra** KOIDZUMI in Bot. Mag. Tokyo XXXI, p. 136 (1917).  
 けなしみやまししうど.  
 Hab. Mt. Ichinoji, Kawagoeishi, valley, etc.
- 426) **Angelica polymorpha** MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb. XIX, p. 185 (1874). しらねせんきう.  
 Hab. Mt. Kose, Usui pass, etc.
- 427) **Angelica schishiudo** KOIDZUMI, Fl. Symb. Or.-Asia. p. 45 (1930).  
 ししうど.  
 Hab. Mt. Atago, Karuizawa plain, Usui pass, etc.
- 428) **Bupleurum sachalinense** FR. SCHMIDT, Reis. Amur. u. Sachal. p. 135 (1868). ほたるさいこ.  
 Hab. Karuizawa plain, Tsurudamari, etc.
- 429) **Chamaele japonica** MAKINO in MAKINO et NEMOTO, Cat. Herb. Tokyo. Imp. Mus. p. 127 (1914). みやませんとうさう.  
 Hab. Mt. Atago, Kyu-Karuizawa, etc.
- 430) **Cicuta virosa** LINNAEUS, Sp. Pl. ed. 1, p. 255 (1753). どくぜり.  
 Hab. Karuizawa plain, Kumoba.
- 431) **Cnidium ajanense** DRUDE in ENGL. et PRANTL., Pfl.-fam. III-8, p. 210 (1898).  
**f. normale** TAKEDA in Bot. Mag. Tokyo XXXII, p. 202 (1918).  
 しらねにんじん.  
 Hab. Mt. Kose, Mt. Ichinoji, etc.
- 432) **Cryptotaenia japonica** HASSKARL in Retzia. I, p. 113 (1855). みつば.  
 Hab. Usui pass, Mt. Yagasaki, etc.
- 433) **Oenanthe stolonifera** A. P. de CANDOLLE, Prodr. IV, p. 138 (1830).  
 せり.  
 Hab. Karuizawa plain, Kumoba, etc.
- 434) **Osmorhiza montana** MAKINO in Journ. Jap. Bot. V-7, p. 28 (1928).  
 みやまやぶにんじん.  
 Hab. Mt. Kose.
- 435) **Peucedanum decursivum** MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb. XXXI, p. 53 (1887). のだけ.  
 Hab. Karuizawa plain, Mt. Yagasaki, etc.
- 436) **Pimpinella calycina** MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.

- XIX, p. 182 (1874). だけぜり.  
 Hab. Mt. Yagasaki, Mt. Hanare, Mt. Kiritsumi, etc.
- 437) **Sanicula chinensis** BUNGE in Mém. Sav. Etr. Pétersb. II, p. 106 (1833).  
 うまのみつば.  
 Hab. Usui pass, Mt. Kose, etc.
- 438) **Seseli Libanotis** KOCH, Gen. Trib. Pl. Umb. 111 (1824).  
**var. daucifolia** FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap. I, p. 184 (1875).  
 いぶきばうふう.  
 Hab. Karuizawa plain, Mt. Hanare.
- 439) **Sium Ninsi** LINNAEUS, Sp. Pl. ed. I, p. 25 (1753). むかごにんじん.  
 Hab. Karuizawa plain.
- 440) **Torilis Anthriscus** GMELIN, Fl. Bad. I, p. 613 (1805). やぶじらみ.  
 Hab. Mt. Kose, New Usui pass, etc.

78) *Cornaceae.*

- 441) **Cornus controversa** HEMSLEY ex PRIN in Bot. Mag. CXXXV, t. 8261 (1909). みづき.  
 Hab. Usui pass, Mt. Atago, Mt. Kose, etc.
- 442) **Cynoxylon japonica** NAKAI, Fl. Sylv. Korea. XVI, p. 69 (1927).  
 やまぼうし.  
 Hab. Usui pass, Mt. Kose, Mt. Yagasaki, etc.
- 443) **Helwingia japonica** WILLDENOW ex F. G. DIETRICH, Nacht. Gart. Lexc. III, p. 660 (1817). はいかだ.  
 Hab. Mt. Yagasaki, Mt. Atago, New Usui pass, etc.

79) *Diapensiaceae.*

- 444) **Schizocodon soldanelloides** SIEBOLD et ZUCCARINI in Abh. Akad. Wiss. Muenchen. III-3, p. 725 (1843). いはかがみ.  
 Hab. Mt. Kose.

日本産蘚類ノ原記載文集（其二）

笹岡 久彦

H. SASAOKA: Original descriptions of Mosses collected in Japan (II)

**Anomobryum nitidum** (MITT.) JAEG. Ad. I, 1874, p. 604.

(*Bryum nitidum* (MITT) Musci Indiae Orientalis in Supplem. to the Jour-